

大腸内視鏡検査を受けられる患者様へ

<目的> 大腸を内側から詳しく観察するために行います。


<方法>

以下のように下剤を使用して前処置を行った後、指定日時に来院してください。 肛門から直径約1 cmの内視鏡を挿入し、観察を行います。必要時、生検（病変部組織を採取）やポリープ切除を行います。検査時間は30～60分程度です。

<検査後>

検査終了後は帰宅することが可能です（日帰り）。 腹痛などの異常が出なければ、検査後1時間より飲水・食事が可能です。 後日指定された日に外来受診し、結果をお聞きください。

まれに検査中・検査後に大腸に穴があいたり、出血が起こることがあります。 腹痛が出現したり、肛門から出血がある場合には病院までご連絡ください。



<検査前日>

朝・昼・夕食は消化の良いものでお腹に残らないものにしましょう。

{食べていいもの}

おかゆ、素うどん、食パン、豆腐、白身魚、味噌汁（具なし）、バナナなど

{避けていただきたいもの}

肉類、野菜（白菜、大根など）、キノコ類、海藻類、こんにやくとうもろこし、種のある果物（キウイ、イチゴ、スイカなど） そば、牛乳、実のあるジュースなど

<自宅で前処置される方>

検査前日 夜 9時頃

マグコロールを 1 本飲んで下さい。

検査当日 朝食は絶食です。

- ・水分はかまいませんが水かお茶にしてください。
- ・午前 6 時から腸管洗浄剤（2 L）を飲み始めて下さい。

◇腸管洗浄剤の服用方法

- ① 2 Lの水で溶かしておく。
- ② 1 時間に 1 Lのペースで 2 時間以内に飲みきってください。

<病院で前処置される方>

検査前日 夜 9時頃


処方された下剤を服用して下さい。

検査当日 朝食は絶食です。

- ・水分はかまいませんが水かお茶にしてください。

◇ 9 時に当院に来院して下さい。

<検査ができる目安の便の状態>



※腸管洗浄剤服用後、以下の様な場合、**午前中**に病院へ連絡してください。

- ① 腹痛や嘔気が強く、全量服用できない
- ② 全量飲みきったが、午前中に便がきれいにならない

<内服薬について>

- 血圧、心臓、抗てんかん薬などのお薬を内服中の患者様は、腸管洗浄剤を飲んだ後に水かお茶で内服して下さい。
- 血糖降下剤服用の方は、当日の朝のみ内服を中止して下さい。
- 血液を固まりにくくする薬を飲んでいる方は、主治医の指示で検査数日前より内服を中止する場合がありますので申告して下さい。

<鎮静剤使用について>

- 鎮静剤は、不安や苦痛を緩和して出来るだけ楽に検査を受けて頂くために使用します。点滴をして十分に観察をしながら検査を行います。
- 薬を使うことで呼吸が浅くなり血圧が一時低くなったりすることが稀にありますが、その時には適切な対応をさせていただきます。
- 検査終了後1時間前後、院内での安静が必要です。

※検査の当日は原則として、車の運転、危険な場所での作業は控えて下さい

※ご不明点があれば当院までご連絡下さい。0725-55-1919 (内科外来)